

Algemene Voorwaarden van Smile Art

Voorwaarden voor het gebruik van aligners

- Draagtijd: De aligners moeten minimaal 22 uur per dag gedragen worden voor een optimaal resultaat.
- Verwisselen van aligners: Volg strikt het schema zoals voorgeschreven door de orthodontist of tandarts. Wissel elke 11-14 dagen van aligner.
- Reiniging: De aligners moeten dagelijks worden gereinigd met lauw water. Niet heet water!
- Voeding: Vermijd het eten en drinken (behalve water) terwijl de aligners worden gedragen.
- Opslag: Bij het uitnemen moeten de aligners veilig worden opgeborgen in een beschermende houder.
- Controle afspraken: Regelmatige controles bij de orthodontist zijn verplicht om de voortgang te monitoren. In ieder geval een keer in de maand.
- Pijn en ongemak: Enig ongemak kan optreden bij het wisselen naar een nieuwe aligner, dit wordt als normaal beschouwd.
- Beschadigingen: In geval van breuk of verlies, onmiddellijk contact opnemen met de behandelaar.
- Mondhygiëne: Een goede mondhygiëne is essentieel; tanden moeten grondig gepeetst worden voordat de aligners teruggeplaatst worden.
- Gebruik door minderjarigen: Indien een minderjarige de aligners draagt, is ouderlijk toezicht aanbevolen.
- Instructies opvolgen: De instructies van de behandelaar moeten strikt worden opgevolgd en er mag geen maandelijks consult overgeslagen worden.
- Correcte wisselfrequentie: Bij het te snel verwisselen van de aligner zal de aligner niet passen en kunnen er complicaties optreden; hier zijn wij niet verantwoordelijk voor.
- Gebruik van chewies: Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verkeerd gebruiken van de chewies of het doorslikken hiervan.
- Loskomen van kronen: Wij zijn niet verantwoordelijk voor het loskomen van een kroon; indien deze loskomt tijdens een alignerbehandeling, zat hij waarschijnlijk al los.

- Retentie na behandeling: Na de behandeling is retentie middels een nachtbeugel vereist. Indien dit niet wordt gedragen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het terugschuiven van de tanden naar de oude positie. De garantie vervalst.
- Indien iemand akkoord is met het eindresultaat en er dus een nachtbeugel vervaardigd wordt kan er niet meer gecorrigeerd worden.

Risico's van het gebruik van aligners

- Irritatie van tandvlees en wangen: In het begin kan lichte irritatie optreden, die meestal na enkele dagen afneemt.
- Spraakverandering: Sommige gebruikers ervaren een tijdelijke verandering in spraak of lichte slissing in het begin.
- Tandverplaatsing: Indien de aligners niet correct of niet lang genoeg gedragen worden, kan dit leiden tot een onjuiste verplaatsing van de tanden.
- Verlies of beschadiging: Indien een aligner verloren of beschadigd raakt, kan dit de voortgang van de behandeling vertragen.
- Opbouw van bacteriën: Slechte hygiëne kan leiden tot een verhoogd risico op tandvleesontsteking en tandbederf.
- Pijn en druk: Sommige gebruikers kunnen pijn of een verhoogde druk ervaren bij het dragen van nieuwe aligners.
- Allergische reacties: In zeldzame gevallen kunnen allergieën optreden voor het materiaal van de aligners.
- Niet geschikt voor alle gebitsproblemen: Aligners zijn niet geschikt voor alle orthodontische gevallen; een consultatie met een specialist is vereist.
- Langere behandelingstijd bij niet-naleving: Het niet consequent dragen van de aligners kan de totale behandelingsduur verlengen.
- Onvoorziene complicaties: In zeldzame gevallen kunnen er complicaties optreden die extra behandelingen vereisen.
- Risico op tandvleesrecessies: Het tandvlees kan zich terugtrekken door de druk van de aligners.
- Kans op wortelresorptie: De wortels van de tanden kunnen in sommige gevallen korter worden door het verplaatsen van de elementen.
- Beschadiging van glazuur: Bij het verwijderen van de attachments kan een klein beetje glazuur (buitenste deel van de tand) beschadigd raken.

- Gevoeligheid na IPR: Na het toepassen van interproximale reductie (IPR) kunnen tanden in het begin een beetje gevoelig zijn.
- Tandvleesirritatie: Het tandvlees kan geïrriteerd raken door randjes van de aligner of attachments.
- Cariës en tandvleesproblemen: Cariës, tandvleesproblemen, ontstekingen en verkleuring kunnen tijdens de behandeling ontstaan. De oorzaak hiervan ligt echter bij dieet en mondhygiëne. U dient zelf zorg te dragen voor een goede mondhygiëne en regelmatig een mondhygiënist of preventieassistent te bezoeken.
- Afwijkend eindresultaat: Niet bij iedereen is een perfect opgelijnde randboog mogelijk. Het uiteindelijke resultaat kan afwijken van de verwachtingen.
- Het filmpje van hoe de tanden komen te staan is een simulatie en kan dus afwijken van het uiteindelijke resultaat.
- Veranderingen in speekselvloed: Mogelijk ervaart u meer of minder speekselvloed. Dit herstelt zich vaak na ongeveer twee weken. Medicatie kan dit verergeren.
- Kaakgewricht- en spierproblemen: Er is geen verband tussen kaakgewricht- of spierproblemen en de alignerbehandeling. Indien dit optreedt, is dit toeval.